

- اولین تعویض پانسمان سه تا پنج روز بعد از عمل جراحی انجام می‌شود.
- جهت انجام پانسمان اصولی و بررسی‌های مکرر زخم به درمانگاه همین مرکز مراجعه نمایید.
- پانسمان‌های بعدی یک روز در میان انجام شود.
- ویزیت جراح حداقل هفت‌های یکبار انجام شود.
- از وارد آمدن فشار، ضربه، کشیدگی، حرکات ناگهانی و آسیب به ناحیه عمل خودداری شود.
- ↳ آزادسازی ناحیه فلپ ۳-۲ هفته پس از عمل جراحی انجام خواهد شد.
- محل عمل بی‌حرکت نگه داشته شود.
- در صورتی که ناحیه فلپ شده در قسمت کمر و باسن باشد، به هیچ عنوان روی این ناحیه نخوابید.
- در حد امکان ناحیه فلپ بالا نگه داشته شود.
- از تماس ناحیه فلپ با تشک خودداری شود. به طور مثال: اگر ناحیه فلپ شده در ساق یا مج پا قرار دارد با کمک یک بالشت در قسمت بالاتر از ناحیه عمل،

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| (۴ ساعت) | اطفال کمتر از ۶ ماه   |
| (۶ ساعت) | کودکان ۶ماه تا ۳ سال  |
| (۸ ساعت) | افراد بالاتر از ۳ سال |

مسواک و نخ دندان بعد از شام و صبح عمل انجام شود.  
 حتماً قبل از مراجعه برای عمل جراحی حمام کنید.  
 موهای محل عمل جراحی (در جراحی گرافت و فلپ، محل دهنده پوست که توسط جراح به بیمار گفته شده است) با دقت تراشیده شود.  
 ↳ در صورت ابتلا به هر ناخوشی و بیماری قبلی مانند دیابت، فشارخون، صرع، هپاتیت (زردی)، ایدز، کم کاری یا پرکاری تیروئید، ناراحتی‌های گوارشی، بیماری‌های قلبی و... یا مصرف هرگونه دارو و مواد مخدّر، سابقه دریافت خون، گذاشتن پروتز و اعمال جراحی قبلی، حساسیت غذایی و دارویی در اولین فرصت به پزشک جراح خود اطلاع داده شود تا از بروز مشکلات احتمالی برای شما پیشگیری گردد.  
 ↳ روز عمل جراحی حتماً برگه آزمایش خون، نوار قلب و... آورده شود.

**جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور (چگونه برای عمل جراحی آماده شویم؟) مراجعه نمایید.**

### مراقبت‌های پس از عمل جراحی

### فلپ چیست؟

مجموعه‌ای از بافت‌هاست (شامل: پوست، عضله و...) که برای پوشش کمبود بافتی در محل آسیب بکار می‌رود. در این جراحی از پوست، رگ خون، ماهیچه، چربی یا استخوان برای پوشاندن زخم استفاده می‌شود و بسته به نوع فلاپ قطعه به محل اولیه چسبیده است یا از آن جدا است. (فلاپ آزاد)

پس از جراحی در صورتی که ناحیه جراحی در صورت و گردن قرار دارد، در روزهای اول از رژیم مایعات شامل آب، آبمیوه‌های طبیعی و رژیم نرم شامل انواع سوپ، شیربرنج، حلیم، پوره‌ها و غذاهای میکس شده استفاده نمایید. به منظور پیشگیری از پس زدن پیوند طبق زمان‌های تعیین شده جهت بررسی ناحیه توسط پزشک مراجعه نمایید.

### آمادگی‌های لازم قبل از عمل جراحی

مدت زمان لازم برای ناشتا بودن قبل از عمل جراحی:



## مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) خودمراقبتی در جراحی فلپ

برنامه پزشکان متخصص در درمانگاه

روز	پزشکان فوق تخصص
شنبه	دکتر عمرانی فر (صبح ها) - دکتر یداللهی (عصر ها)
یک شنبه	خانم دکتر یادگاری - خانم دکتر فرزام نیا
دو شنبه	دکتر ادیب (صبح ها) - آقای دکتر یداللهی
سه شنبه	خانم دکتر مستاجران - خانم دکتر صادقی
چهار شنبه	آقای دکتر پیری - آقای دکتر صادقی
	آقای دکتر قانعی - خانم دکتر یادگاری
	آقای دکتر معین

جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن های مرکز داخلی  
۳۰۶ (صبحها) و داخلی ۱۱۴ (عصر و شب) تماس  
حاصل نمایید.

۰۳۱-۳۳۴۵۷۶۷۰-۳

شماره فاکس: ۰۳۱-۳۳۴۵۸۸۰۳

شماره تلفن نوبت گیری از درمانگاه های تخصصی:  
۰۳۱-۳۳۰۳۳۹۷۰

[www.savaneh.mui.ac.ir](http://www.savaneh.mui.ac.ir)

واحد آموزش سلامت  
کد: F

پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

داروهای تجویز شده توسط پزشک از آنتی بیوتیک ها و مسکن ها را سر ساعت و طبق دستور مصرف نمایید.

برای کمک به ترمیم زخم از میوه های حاوی ویتامین A نظیر آب هویج، آناناس، آب نارگیل و ... استفاده کنید.

درصورتی که گرافت نداشته باشید ۳ تا ۵ روز بعد از عمل با نظر پزشک می توانید دوش بگیرید ولی روی ناحیه عمل چیزی کشیده نشود.

درصورت انجام فلپ و گرافت پس از ویزیت جراح و اجازه ایشان مجاز به حمام کردن می باشید.

از دستکاری و خاراندن فلپ خودداری نمائید.

عضو فلپ شده را در وضعیت مناسب قرار دهید. (طبق دستور پزشک)

تایید کننده:

آقای دکتر عابدینی (متخصص جراحی عمومی)  
آقای دکتر آرمانفر (فوق تخصص جراحی پلاستیک)

از برخورد محل فلپ شده با تشک جلوگیری کنید.

درصورتی که فلپ در ناحیه کمر، باسن و پاها باشد حتما برای راه رفتن از پزشک اجازه بگیرید. برای تسهیل در راه رفتن می توانید از عصا استفاده کنید.

رژیم غذایی مایعات به همراه سبزیجات و میوه های تازه از بروز یبوست و افزایش فشار داخل شکم جلوگیری می کند.

جهت جلوگیری از تورم بدن از غذاهای کربنات دار مثل نوشابه، آبمیوه های مصنوعی، آب معدنی های حاوی کربنات (سода)، غذاهای حاوی ادویه و حاوی سدیم (نمک) بالا خودداری کنید.

از خوردن غذاهای محرک مثل بادمجان، گوجه فرنگی، سیر، فلفل، سوسیس و کالباس به دلیل ایجاد سوزش و خارش خودداری نمائید.

درصورت داشتن علائم ترشح، بوی بد زخم، سیاه شدن فلپ، تب و لرز و هرگونه علامت غیرطبیعی به